# POSITON CREMA
# POSITON UNGÜENTO

# POSITON CREMA

**COMPOSICION**
Cada 100 gramos contienen:

| | |
|---|---|
| Acetónido de Triamcinolona | 100 mg |
| Neomicina (sulfato) | 250 mg |
| Nistatina | 10.000.000 U.I |

Excipientes:
Estearato de polioxila 40, monoestearato de glicerilo autoemulsionante, vaselina blanca, alcohol cetoestearílico, hidróxido de aluminio (gel seco), dióxido de titanio, sorbitol solución, propilenglicol, diclorhidrato de etilendiamina, metilparabeno (E218), propilparabeno (E216), ácido sórbico (E200), dimeticona, agua, c.s.p.

**ACCION**
Positon Crema combina un corticoide antiinflamatorio (acetónido de triamcinolona), un antibiótico de amplio espectro antibacteriano (neomicina sulfato), y un antibiótico con excelentes propiedades antifúngicas (nistatina), preparado todo ello en una crema evanescente.

**INDICACIONES**
Se utilizará en los procesos que a continuación se citan, especialmente cuando exista o haya riesgo de una infección bacteriana o moniliásica secundaria.
Dermatitis (atópica, eczematoide, por estasis, numular, por contacto, exudativa, seborreica y neurodermatitis).
Prúrito anogenital
Ezcema
Liquen simple crónico
Moniliasis cutánea
Infecciones bacterianas superficiales

**POSOLOGIA Y MODO DE EMPLEO**
2-3 aplicaciones diarias según criterio facultativo.

**ADVERTENCIAS SOBRE EXCIPIENTES**
Por contener ácido sórbico como excipiente, en uso cutáneo puede causar dermatitis.

**CONTRAINDICACIONES**
Tuberculosis cutánea activa
Manifestaciones cutáneas de la sífilis
Dermatitis por virus
Sensibilización al fármaco

**PRECAUCIONES**
No utilizar en terapia ocular ni en zonas próximas a los ojos.
En embarazo evitar su aplicación en grandes dosis, zonas extensas o tratamientos prolongados.
No aplicar vendaje oclusivo en zonas muy extensas de la piel, ya que puede producirse absorción sistémica con riesgo de toxicidad.
Se recomienda suspender el tratamiento gradualmente.

**INCOMPATIBILIDADES E INTERACCIONES**
No se han descrito

**EFECTOS SECUNDARIOS**
Reacciones de hipersensibilidad.
En tratamiento prolongado, alteraciones atróficas de la piel, pérdida de colágeno y estrías dérmicas.
En tratamiento con vendaje oclusivo puede producir efectos secundarios sistémicos.

**INTOXICACION**
En caso de sobredosis o ingestión accidental consultar al Servicio de Información Toxicológica. Tlf. 915620420.

**PRESENTACION**
Tubos de 30 g y 60 g

CON RECETA MÉDICA

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

FAES FARMA, S.A.
Máximo Aguirre, 14 – 48940 Leioa

Revisión: 06-09

# POSITON UNGÜENTO

**COMPOSICION**
Cada 100 gramos contienen:
Acetónido de Triamcinolona……..100 mg
Neomicina (Sulfato)…….. 250 mg
Nistatina……..10.000.000 U.I
Excipientes:
Plastibase…… c.s.p.
(Polietileno bakelita y aceite mineral)

**ACCIÓN**

POSITON ungüento combina un corticoide antiinflamatorio (acetónido de triamcinolona), un antibiótico de amplio espectro antibacteriano (neomicina sulfato), y un antibiótico con excelentes propiedades antifúngicas (nistatina), preparado todo ello en una base protectora (vehículo oleaginoso para ungüentos).

**INDICACIONES**

Se utilizará en los procesos que a continuación se citan, especialmente cuando exista o haya riesgo de una infección bacteriana o moniliásica secundaria:
Dermatitis (atópica, eczematoide, por estasis, numular, por contacto, exudativa, seborreica y neurodermatitis).
Prurito anogenital.
Eczema.
Liquen simple crónico.
Moniliasis cutánea.
Infecciones bacterianas superficiales.

**POSOLOGÍA Y MODO DE EMPLEO**

2-3 aplicaciones diarias, según criterio facultativo.

**CONTRAINDICACIONES**

Tuberculosis cutánea activa.
Manifestaciones cutáneas de la sífilis.
Dermatitis por virus.
Sensibilización al fármaco.

**PRECAUCIONES**

No utilizar en terapia ocular ni en zonas próximas a los ojos.
En embarazos evitar su aplicación en grandes dosis, zonas extensas o tratamientos prolongados.
No aplicar vendaje oclusivo en zonas muy extensas de la piel, ya que puede producirse absorción sistémica con riesgo de toxicidad.
Se recomienda suspender el tratamiento gradualmente.

**INCOMPATIBILIDADES E INTERACCIONES**

No se han descrito.

**EFECTOS SECUNDARIOS**

Reacciones de hipersensibilidad.
En tratamiento prolongado, alteraciones atróficas de la piel, pérdida de colágeno y estrías dérmicas.
En tratamiento con vendaje oclusivo puede producir efectos secundarios sistémicos.

**INTOXICACIÓN**

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica.
Tlf. 91-5620420.

**PRESENTACIÓN**

Tubos con 30 g. y 60 g.

CON RECETA MÉDICA

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

**FAES FARMA, S.A.**
**Máximo Aguirre, 14 – 48940 Leioa**